

Дорожная карта по профилактике и борьбе с лекарственно-устойчивым туберкулезом



Всемирная организация
здравоохранения
Европейское региональное бюро

Примеры наилучшей практики

Азербайджан

Главное медицинское управление Министерства юстиции Республики Азербайджан в рамках Проекта по контролю за распространением туберкулеза в учреждениях пенитенциарной системы регулярно проводит скрининг среди заключенных и находящихся под следствием граждан, начиная работу со следственных изоляторов. Обязательный алгоритм диагностики включает заполнение анкеты и проведение рентгенологического исследования. Образцы мокроты, собранные от больных с подозрением на ТБ, проходят троекратное исследование микроскопии мазка и посева. Регулярно проводятся быстрые диагностические тесты на чувствительность с использованием новейших средств диагностики. Лица с подозрением на ТБ и/или с выявленным ТБ незамедлительно изолируются в отдельных палатах и в течение нескольких дней (не позднее, чем через неделю) переводятся в специализированный лечебный центр Министерства юстиции, где осуществляется лечение всех форм ТБ, включая лекарственно-устойчивый туберкулэз. В этом закрытом медицинском учреждении Минюста проводится лечение всех заключенных и лиц, находящихся под следствием, независимо от пола, возраста, типа внутреннего режима и условий наказания согласно решению суда.

Эстония

Эстония занимает второе место в Регионе по потреблению алкоголя на душу населения, алкоголизм широко распространен среди больных ТБ и МЛУ-ТБ, прерывающих лечение. В 2011 г. демонстрационный проект начался с обучения сотрудников проведению теста на выявление расстройств, связанных с употреблением алкоголя (AUDIT) и координации действий между национальной противотуберкулезной и психиатрической службами, предлагающими консультирование и лечение алкоголизма пациентам, находящимся на лечении ТБ. В Эстонии осуществляются совместные мероприятия по ТБ/ВИЧ, такие как тестирование на ВИЧ больных туберкулезом и скрининг на ТБ среди людей, живущих с ВИЧ, проводится назначение сопутствующего лечения противотуберкулезными препаратами, антиретровирусная терапия и опиоидная заместительная терапия по показаниям, осуществляется информирование больных и обучение медицинских специалистов. Эти меры привели к более раннему выявлению случаев заболевания туберкулезом и ВИЧ-инфекции, снижению показателей отрывов от лечения среди ВИЧ-инфицированных больных ТБ и повышению уровня информированности о туберкулезе среди лиц, живущих с ВИЧ (19).